

DESCRIPTION DE CÉTONIDES NOUVEAUX REUEILLIS PAR M. L. BURGEON  
AU CONGO BELGE ET APPARTENANT AUX COLLECTIONS DU MUSÉUM  
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. A. BOURGOIN.

2<sup>e</sup> NOTE.

**Coenochilus strigatus** nov. sp.

♂ *Niger, sat nitidus; pronoto fere orbiculari, regulariter dense punctato, disco medio sulcato, lateribus rotundato-angulatis; scutello minus punctato, lateribus sulcatis; elytris sulcis duobus primis bistriatis, externis interruptis; pygidio convexo, densissime longitudinaliter squamato strigillato; pectore lateribus grosse, episternis minus fortiter punctatis; segmentis ventralibus medio leviter depressis, lateribus, lateribus punctato-striatis; tibiis omnibus etus internibus, posticis apice intus incrassatis, breviter pilosis.*

*Long.* 16 mm. 5; *Lat. max.* 6 mm. 8.

Province de Maniéma : Kindu (1917).

Tout noir, assez brillant en dessus, davantage en dessous, à ponctuation dense, fine, ronde, bien marquée, régulière, les points séparés sur le dessus par un intervalle à peu près double de leur diamètre. Tête absente; pronotum aussi long que large, anguleusement arrondi sur les côtés, sa base faiblement échancrée devant l'écusson; disque à sillon médian profond, formé d'une succession de gros points ronds, taugents, atténué à ses extrémités, commençant au tiers antérieur et n'atteignant pas la base. Écusson à ponctuation peu dense, corrodé sur ses bords en un sillon large et profond. Élytres à suture pas plus élevée que les intervalles costiformes; deux premiers sillons très régulièrement gravés en rainure, commençant au niveau de la pointe de l'écusson; l'interne se perdant près de la suture, avant le sommet, le second derrière le calus apical; le fond de chacun d'eux gravé de deux stries continues excessivement fines qui séparent trois intervalles très ténus; la côte qui longe en dehors le deuxième sillon rejoint

la côte humérale au calus apical; elles enclosent deux lignes tirées séparées par un étroit intervalle: ponctuation latérale excessivement dense et fine, striolaire au sommet. Dessous glabre, à ponctuation très fine au milieu, plus grosse et pupillée sur les côtés du pectus, striolaire sur ceux du ventre: tibias postérieurs, vers leur sommet, dilatés en dedans et portant une brosse de poils courts.

*Coenochilus carinipes* nov. sp.

♀. *Niger, nitidus, dense punctatus: pronoto lateribus marginatis, antice rotundatis, postice sinuatis; basi fere recto, bi-impresso. clytris quinquestriatis tibis omnibus quadratis, striatis, carinatis.*

*Long.* 14 millimètres; *lat. max.*, 6 millimètres.

kindu (1917).

Noir, brillant, dessous tirant sur le brun, à ponctuation ronde, fine; dense, régulièrement distribuée. Tête rugueuse, à carène obtuse, transversale, clypéus dilaté et échancré en avant comme chez les espèces voisines; pronotum convexe, peu plus large en son milieu que long, ses côtés rebordés, arrondis en avant, sinueux en arrière; angles postérieurs obtus, base rectiligne portant deux impressions finement striolées; écusson peu ponctué à sommet très aigu. Élytres assez convexes, à cinq stries profondes n'atteignant ni la base ni le sommet; les deux premières portant en leur fond deux stries fines séparées par un étroit espace pointillé; dans les autres, ces stries sont interrompues et remplacées par des points ovalaires ou très allongés; la cinquième moins nette, et confluyente en arrière avec une sixième très abrégée en avant; suture et intervalles finement, densément et régulièrement ponctués, cette ponctuation devenant progressivement striolaire, sur les déclivités, vers le sommet; les strioles sont très fines et très drues au bord postérieur. Pygidium brun, peu convexe, très densément et finement ponctué, à pubescence éparse, courte, dorée. Métasternum très finement et très densément ponctué, à pubescence dorée assez longue; ventre convexe finement et densément ponctué; fémurs striolés, à pubescence rousse, très courte, au bord interne; tibias équarris, fortement sillonnés, à arêtes et carènes tranchantes; carène externe des antérieurs dilatée en pelle bidentée au sommet, concave en dessous.

*C. strigosus* et *C. carinipes* sont décrits sur des individus défectueux trouvés morts dans des toiles d'araignées.

**Pseudastoxenus** NOV. GEN.

*Gen.* *Astoxeno approximatum*, similiter constructum, sed clypeo antice recurvato, medio lobato.

**Pseudastoxenus favosus** nov. sp.

♂ *Niger*, haud nitidus, luteo-variegatus et squamosus; fronte utrinque inter oculos breviter transversim carinata; pronoto transverso, lateribus rotundato angulatis, disco sinuatim striolato; elytris depressis, varioloso-punctatis.

*Long.* 12 mm. 7; *lat. max.* 6 mm. 8.

Noir, terne, dessus densément varié de jaune terreux et de squames roussâtres, d'aspect ciréux. Tête rugueusement ponctuée-striolée; canthus oculaires prolongés par une brève carène entre le front et le clypéus; ce dernier incliné, à rebord tranchant, peu élevé sur les côtés, mais fortement retroussé en pointe en avant; face visible du menton en bouclier plan, allongé, à striolation éparsse, obsolète; antennes noires à sommet brun. Pronotum transversal, atténué fortement en avant et en arrière, anguleusement arrondi vers le milieu des côtés; ceux-ci, ainsi que la base, rebordés jusqu'au tiers antérieur; surface sinueusement et fortement striolée en travers; écusson équilatéral, ses côtés fortement incurvés, son sommet très aigu. Élytres sans côtes, largement déprimés vers la suture, plus profondément en avant, couverts de gros points varioliques, peu visibles sur les déclivités où le revêtement squameux est dense; pygidium convexe, squameux. Dessous éparsément squameux, à striolation latérale assez dense mais confuse, surtout sur l'abdomen; celui-ci un peu déprimé et finement ponctué en son milieu; tibias antérieurs tridentés, les autres bidentés au bord externe; tarses à peu près égaux aux tibias.

**Pseudastoxenus Burgeoni** nov. sp.

♀. *Nigro brunneus*, opacus, squamulis minutis brunneo-griseis vestitus, ubique densissime punctatus. Fronte plana, clypeo subquadrato, medio leviter elevato; pronoto transverso, hexagono, lateribus angulatis, haud marginatis; elytris medio depressis, lateribus anguste griseo-trifasciatis.

*Long.* 10 millimètres; *lat. max.* 6 millimètres.

Kindu (1917).

Brun noir, mat, partout couvert de squamules grisâtres très fines et d'une ponctuation ronde, fine, bien nette, très dense, réunie par endroits en stries longitudinales dans les dépressions des élytres.

Tête plane, sans carènes, elyptés légèrement transversal, faiblement rebordé sur les côtés, à angles arrondis; bord antérieur retroussé en une pointe peu élevée arrondie au sommet; menton en écusson subcarré, obsolètement striolé en travers. Pronotum convexe, transversal, hexagonal, à angles antérieurs aigus, postérieurs presque droits; côtés anguleusement dilatés vers leur milieu, non rebordés; base convexe. Écusson équilatéral à côtés incurvés, angle postérieur très aigu. Élytres sans côtes nettes, déprimés vers la suture, calus arrondis, saillants; déclivités arrondies portant chacune sur leur moitié postérieure trois étroites fascies squameuses grisâtres, ternes; pygidium plat, déprimé de chaque côté et à son sommet vaguement caréné en long. Pattes ponctuées et squamulées comme le reste du corps; tibias ayant tous deux dents obsolètes au bord externe; tarses à peu près égaux aux tibias.

**Mecaspidius** NOV. GEN.

♀. *Ovatus, crassus, sat convexus. Capite quadrato, clypeo rectangulari, longitudine duplo latiore, antice valde marginato, nec sinuato nec lobato. Prothorace transverso, trapezoidali, basi circulariter rotundato, lateribus ante basin excisis; scutello elongato, acuto; elytris inaequalibus, angulis posticis leviter acutis; processu mesosterni sat lato, leviter prominulo, antice rotundato; tibiis anticis extus oblique truncatis, obsolete bidentatis.*

**Mecaspidius cinereus** NOV. SP.

♀. *Niger, opacus, griseo-vestitus, grosse punctatus, breviter pilosus.*

*Long.* 10 millimètres; *lat. m.v.* 6 mm. 7.

Kindu (1917).

Noir, terne, grossièrement ponctué, à revêtement tomenteux grossier, gris cendré et à poils brun roux, dressés, très courts. Tête carrée à points ronds, profonds, séparés par un intervalle à peu près égal à leur diamètre; elyptés rectangulaire deux fois aussi large que long, à rebord épais en avant, antennes noires; menton transversal, terminé en triangle obtus. Corselet raboteux, à ponctuation grosse, ronde, dense, à base bi-impressionnée, fortement avancée en arc de cercle entre les élytres; côtés convergents en avant, non rebordés, échanerés en arc sur leurs tiers postérieur; angles postérieurs obtus à sommet net; écusson une fois et demie aussi long que large, à côtés concaves et sommet aigu. Élytres à surface très inégale, raboteux, profondément déprimés sur la moitié antérieure du disque; à gros points ronds isolés ou réunis, visibles par endroits, plus ou moins alignés sur le disque; calus nuls, sommet légèrement sinué

de chaque côté de l'angle sutural. Pygidium plat, à surface inégale, arrondi au sommet. Pointe mésosternale assez large, légèrement saillante, arrondie subogivale; ponctuation et revêtement à peu près pareils en dessus et en dessous; pattes comprimées, tibias épais à bord externe tranchant; les antérieurs obliquement tronqués au sommet en dehors, troncatüre obsolètement bidentée; tarsi égaux aux tibias.

Cette espèce, assez différente des autres *Crémastochilides*, ressemble par sa coloration et la forme générale de son corps à certains *Cureulionides* du genre *Mecuspis*.

***Genuchus ruficornis* nov. sp.**

♀ *Niger, nitidus, elongatus; capite leviter impressa, atrinque post oculos transversim, in fronte medio fortius carinata; clypeo verticali, fortiter gibboso, antice sinuato, antennis rufis; pronoto a basi rotundato-angustato; elytris singulis quadri-striatis, striis geminatis intercellis fortiter punctatis; pygidio bruno, depresso, medio longitudinaliter carinato.*

*Long.* 7 mm. 6; *lat. max.* 3 mm. 5.

Kindu (1917).

Noir, brillant, allongé, fortement ponctué. Tête mate, à ponctuation très dense, vertex convexe, séparé, par une carène obsolète, de la dépression frontale; côtés du vertex transversalement carénés au-dessus et un peu en dedans des yeux, les carènes tranchantes, n'atteignant ni les bords ni les yeux; clypéus vertical portant en son milieu une forte gibbosité terminée à son sommet par une carène tranchante qui limite en avant le milieu du front; bord antérieur du clypéus largement échancré; antennes rousses. Pronotum transversal, largement arrondi à la base, atténué en avant, à ponctuation grosse, ronde, pupillée dans le sillon médian et de chaque côté des étroits espaces lisses qui le limitent, rugueuse, très dense, sur les côtés et en avant. Écusson triangulaire, striolé en long, à mince rebord lisse; élytres à disque inégal, gravés chacun de quatre doubles stries profondes, plus ou moins caténiformes; intervalle sutural à points allongés, le plus souvent alternés sur deux rangs; le suivant avec une rangée de points presque semblables, obliques, pupillés sur leur partie antérieure; le troisième plus large que le second, portant deux rangées de points et, en son milieu, ainsi que le cinquième, une tache squameuse grise: le quatrième étroit, avec un seul rang de points; le cinquième, moins élevé, limite la déclivité latérale densément couverte de points ronds pupillés plus ou moins réunis en stries transversales: sommet rougeâtre. Pygidium incliné, saillant, déprimé, rougeâtre, à carène longitudinale noire, sommet en ogive surbaissée, obtuse. Tibias antérieurs au bord ex-

terne sinués plutôt que dentés; médians et postérieurs ayant une petite tache rouge vers leur milieu et une petite épine externe au bord inférieur de cette tache.

**Lissogenius simplicipes** nov. sp.

♂ *Niger, sat nitidus, cicatricibus ellipticis dense signatus, haud luteo-variegatus; tarsi 5-articulati, anticorum articulis omnibus simplicibus, ultimo haud constricto,*

*Long.* 7 millimètres; *lat. max.* 3 mm. 8.

Kindu (1917).

Noir, assez brillant, sans trace de reliefs jaunâtres, densément couvert d'une forte ponctuation plus ou moins ovulaire, formant une réticulation dense sur la tête et le pronotum. Vertex très convexe, carène frontale interrompue en son milieu; clypéus finement rebordé, ses côtés parallèles en arrière, convergents en avant; échancrure apicale peu profonde. Pronotum à surface inégale, ses côtés arrondis en leur milieu, sinués en avant, plus fortement en arrière; les angles postérieurs marqués par une très petite dent; base rectiligne, lisse en son milieu, pas plus large que l'écusson; celui-ci densément couvert de gros points pupillés. Disque des élytres inégal, déprimé en avant, relevé au milieu, plan en arrière, couvert de gros signes ovulaires allongés, séparé des déclivités par une côte obtuse, ponctuée comme le reste de la surface; déclivités densément couvertes de gros points polygonaux aussi longs que larges; pygidium convexe, faiblement caréné sur la moitié basilaire de sa ligne médiane, à ponctuation ronde. Pectus à gros points arrondis; segments ventraux à peine déprimés, à gros points ronds; tibias antérieurs obsolètement bidentés; tarsi à cinq articles subcylindriques, les antérieurs n'ayant pas le cinquième article divisé par un étranglement; ongles mobiles très petits.